



Análisis de seguridad de Certolizumab pegol en mujeres durante la gestación y lactancia

Jornadas farmacológicas
ACTUALFARMA

Diego Gámez Torres, Marina Sánchez Valera, Belén Sánchez Rodríguez

1. Introducción:

Se desconoce la seguridad de anticuerpos monoclonales en embarazadas y lactantes.


2. Objetivo:

Analizar seguridad de Certolizumab en pacientes con intención de embarazo, embarazadas y lactantes.

3. Métodos:

Análisis retrospectivo, observacional, descriptivo desarrollado en un hospital de tercer nivel. Criterio de inclusión: pacientes con intención de embarazo, embarazadas y lactantes que padecen enfermedades inflamatorias inmunomediadas: Artritis reumatoide (AR), Artritis psoriásica (AP), Espondilitis Anquilosante (EA) y Artritis idiopática juvenil (AIP) desde Julio-2016 a Enero-2022. Se usó la Historia Clínica y la aplicación de dispensación hospitalaria. Variables revisadas: edad, patología, control de la enfermedad, embarazo actual/pasado/aborto, lactancia, fármacos moduladores de la enfermedad (FAME) y fármacos Anti-TNF previos.

4. Resultados:



■ AR 6 pacientes
■ AP 3 pacientes
■ EA 3 pacientes
■ AIJ 1 pacientes

N= 13

N=13, Media de edad: 36 años (30-44). Duración de enfermedad: 8,46 años(4-15). 11 (85%) pacientes tratados previamente con >1 FAME y 2 (15%) con uno. 3 (23%) se trataron con un Anti-Tnf y 1 (8%) con >1. Se prescribió en 10 (77%) pacientes con intención de embarazo, de ellas 4 (40%) siguen en busca del mismo y 6 (60%) quedaron embarazadas. De éstas últimas, 4 (67%) acabó la gestación y 2 (33%) sigue con ella. 3 (23%) de las pacientes, Certolizumab se pautó dentro del periodo de lactancia. 3 (75%) de pacientes que finalizaron el proceso de gestación, tuvieron un niño sano y 1 (25%) sufrió un aborto, la paciente había quedado embarazada antes de suspender Metotrexato y abortó por recomendación médica. En todas las pacientes embarazada (2), el feto estuvo sano. En pacientes en los que Certolizumab fue pautado en lactancia, el niño se encuentra sano. Todas las pacientes mantuvieron control de la enfermedad durante el tratamiento con certolizumab.

5. Conclusión:

Certolizumab pegol ha mostrado ser un fármaco seguro en el proceso de gestación/lactancia, suponiendo una alternativa a pacientes que precisen tratamiento durante este periodo.

