



UTILIZACIÓN DE CABOTEGRAVIR Y RILPIVIRINA DE ACCIÓN PROLONGADA EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIH: EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO.

De la Calle Riaguas B, Alonso Salmerón FJ.
Hospital Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina. Toledo

INTRODUCCIÓN

- Cabotegravir y rilpivirina de acción prolongada (CAB+RPV AP) constituyen la primera terapia antirretroviral (TAR) de administración intramuscular en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

OBJETIVOS

- Analizar el grado de satisfacción de los pacientes con CAB+RPV AP desde la inclusión de los fármacos en la guía farmacoterapéutica del hospital.

MÉTODOS:

Estudio descriptivo y transversal en un hospital general (Mayo 2023 - Abril 2024) en pacientes en tratamiento con CAB+RPV AP.

❖ **Variables:** Sexo, edad y motivo del cambio.

- ✓ **Satisfacción de los pacientes:** Cuestionario de satisfacción con el TAR (ESTAR):
 - **Nueve preguntas** estructuradas en dos dimensiones (de satisfacción clínica y de satisfacción con el estilo de vida).
 - **Escala 0 - 6 puntos:** 0 (nada satisfecho)-6 (muy satisfecho).

RESULTADOS:

- ✓ **28 pacientes** (68% hombres) ➡ Edad media de **51 años** ($\sigma=12,13$); el 86% < de 65 años

CUESTIONARIO ESTAR	Rango	Valor medio (DE)
1. ¿Se siente satisfecho con el tratamiento que recibe actualmente?	0-6	5,8 (0,5)
2. ¿Se siente satisfecho con la eficacia del tratamiento que recibe actualmente, es decir, de cómo su tratamiento está controlando su infección por el VIH?	0-6	5,9 (0,3)
3. ¿Se siente satisfecho con su tratamiento en relación a los efectos secundarios o molestias asociadas?	0-6	5,2 (1,0)
4. ¿Se siente satisfecho con las exigencias a las que le obliga su tratamiento actual?	0-6	5,2 (1,4)
5. ¿Se siente satisfecho con la flexibilidad de su tratamiento en relación al día en que lo debe administrar?	0-6	5,4 (0,9)
6. ¿Se siente satisfecho con sus conocimientos acerca de la infección por VIH?	0-6	5,9 (0,3)
7. ¿Se siente satisfecho de cómo se adapta su tratamiento su forma de vida?	0-6	5,7 (0,5)
8. ¿Recomendaría la combinación de medicamentos que está recibiendo a alguna otra persona con VIH?	0-6	5,7 (0,7)
9. ¿Cómo se siente de satisfecho con continuar con su tratamiento actual?	0-6	5,9 (0,3)
Puntuación total	0-54	50,7 (0,7)

CONCLUSIONES:

- Los resultados de la encuesta indicaron un elevado grado de satisfacción tras cambiar a CAB RPV AP. El principal motivo de cambio fue minimizar los olvidos relacionados con la toma diaria.

