

PRESCRIPCIÓN DE VITAMINA D EN CENTROS SOCIOSANITARIOS. IMPORTANCIA DEL FARMACÉUTICO

Saiz Molina, JJ; Sánchez Luque, L; Hermida Perez, VC; Pérez; González Escribano, MC; Moreno Charco, E. Hospital Comarcal Santiago Apóstol. P Orón Miranda de Ebro. Burgos





INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS




Niveles de 25-hidroxivitamina D Suficiencia (≥20 ng/ml) Deficiencia (<12 ng/ml) Insuficiencia (12-19 ng/ml)


Indicaciones en pacientes con suficiencia y suplementados




Motivo de prescripción en <20 ng/ml



Con indicación





CONCLUSIONES

- La prescripción en nuestros centros de especialidades de vitamina D es muy elevada, (63,5%)
 La prescripción no se adecua a lo recogido en las guías:
 o Prescripciones sin indicación clara de uso (19,45%).
 o Recomendación de suplementación con calcio y vitamina D en la indicación por déficit (únicamente 12,5%)
 o Monitorización posterior para valorar la necesidad de su uso (28,7% sin monitorización)
 Existe un porcentaje de pacientes (14,6%) en los que, no se consiguen los objetivos de suficiencia.
 Es necesaria la intervención farmacéutica para optimizar la utilización de suplementos de vitamina D.



