

EVALUACIÓN DEL DETERIORO DEL EFECTO AL FINAL DEL INTERVALO DE DOSIFICACIÓN DE FREMANEZUMAB EN MIGRAÑA CRÓNICA REFRACTARIA **Hospital Universitario de Burgos**

Águeda Fernández, JB. Infante Camarero, A. Arnaiz Díez, S. Gutiérrez Fernández, I. Ayastuy Ruiz, A. Sánchez Luque, L



Infundimos conocimiento

INTRODUCCION Y OBJETIVOS

Los anticuerpos monoclonales contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (anti-CGRP) han revolucionado el tratamiento preventivo de la migraña. Sin embargo, algunos pacientes pueden experimentar un empeoramiento de los síntomas a medida que se acerca el final del intervalo de dosificación, fenómeno conocido como "deterioro de fin de dosis (DFD)".

Cuantificar el DFD de fremanezumab en pauta trimestral comparándolo con la pauta posológica mensual

MATERIALES Y MÉTODOS



Historia clínica electrónica y dispensación a pacientes externos .10KXNXKOc. dlccoxOKXXNWx. 'kokoo@KXXNXX1

.kKXXXNNX@1'.

.ckXXx: '

.:dKX01

.:kXXx:

.;xKXk

.,codol;.

- Edad
- Sexo
- Anti-CGRP previosk®K®d¹

lxolloxk@KXXN0.

c000000KXXXXNx

.cdk000x1,

..,:cox0KK0o

:....cok@KXNK: .11:,,:1dk0KXXN0

cKK: :kxdddxk00KXXXXX

;ko.'k00000KKXXNNXNO , kKKKXXXXXXXNNO; .:x0KXXXXKkc.

.c0XXXXXXXNNXd;;;

'kXKd:

'10XKd:

.00X0o

0X01' .;xKXkc

Lx0Kx k0KNx.)KXXNx

,ok00kd:

Numero de dosis de Fremanezumab trimestral recibidas

,00X00

.;xXXkc

.:kXXx:

.;cll1:,. .:dk00kdc' '10XKd:

':10XKd.

, o0X0o .;dKX01'

.;dKXOc

Analisis de DFD

Dias de migraña antes de inicar Fremanezumab y en el primer y tercer mes con ambas pautas

RESULTADOS

- 7 Pacientes incluidos
- Mediana edad 54,5 añños (39,1-64,2)
- 71,4 % (n=5) mujeres
- Ninguno recibio anti-CGRP previamente

.100

.cko

.:kXXx: ':ok@KXNk Antes de iniciar tratamiento con fremanezumab, la mediana de DMMs fue de 18 días (12-30). Durante el tratamiento con la pauta trimestral registraron una

.';cldk000ko:coxkkkdl:

'oKNk:.

.;:;;1x001.

COKYYKOKXXC

.o0XXXXNK1.

,xXXx

.10NO:

.:kNKo

, dXXd.

· 1dkokkyo

..:loolc..

.,;;cldk0KKk;

,;...,:ox00KXKc

,,;codk0KKk

',...,cox0KKNK;

.':loddl:

.ckXXx:..dddddxk0KKXXXc

.ckKd':k0000KKXXNKo.

.,:1dk00k1

'1x0KXXKko'

:cdx00XXN0

.:11:

.o0Xx .c0Xk;

.:kX0:

;xKOc

.',cdkxc.
':'':dOKXd.

CYCCYORYNK

xKKKXXN0;

.;lodo:.

, d001

.1000

.ck0d.

:,,cdkx;

odccox00d

c0000KKO:

'ldxdc'

mediana de DMMt1 de 2 días (0-15) en el mes 1 y de 15 días (8-30) en el mes 3 (DMMt3).

Durante el tratamiento con la pauta mensual presentaron una mediana de DMMm1 de 3 días (0-15) en el mes 1 y de 4 días (0-15) en el mes 3 (DMMm3).

CONCLUSIONES

Se observó, fenomeno de DFD en todos los pacientes del estudio, evidenciado por un aumento de los dias de migraña mensuales en el tercer mes del tratamiento.

- Todo ello sugiere una perdida de eficacia conforme nos acercamos al final del intervalo de dosificación
- La administración mensual de Fremanezumab podría ofrecer un mejor control de la patologia
- Estudios con mayor tamaño muestral y tiempo de seguimiento serian necesarios para confirmar lo anterior



